

Обліки видів флори і фауни різних таксономічних груп та оцінка стану їх популяцій (птахи).

Олександр Бронсков,
*експерт проекту,
начальник науково-дослідного відділу
Національного природного парку «Меотида»*



Застосування даних по видах:

- Заповнення розділу «3. Екологічна інформація» в стандартній і оновлених формах Об'єкту Смарагдової мережі.
- Моніторинг ефективності Плану управління Об'єктом Смарагдової мережі.

Species listed in Resolution 6 and site evaluation for them

Species			Population in the site								Site assessment			
Group	Code	Scientific name	S	NP	Type	Size		Unit	Cat.	Data quality	A/ B/ C/ D	A/B/C		
						Min	Max		C/R/V/ P		Po p.	Co n.	Iso .	Glo .
B	A402	Accipiter brevipes			C	1		i	P	G	D			
B	A255	Anthus campestris			R	500	5000	p	C	G	C	A	C	C

Дані по виду:

1. Тип перебування: р = постійно, г = розмноження, гніздування, с = концентрація під час міграції, w = зимівля.
2. Розмір популяції: мінімум – максимум.
3. Одиниця виміру: і = осіб, р = пар.
4. Категорія поширеності: С = звичайний, R = рідкісний, V = дуже рідкісний, P = присутній.
5. Якість даних: G = "Добре" (наприклад, на основі польових досліджень); M = "Помірно" (наприклад, на основі часткових даних з їх екстраполяцією); P = "Погано" (наприклад, груба оцінка); DD = при дефіциті даних.

Оцінка сайту:

1. Популяція (відносна у національному масштабі значимість розміру та густоти популяцій видів): A = 100% - 15%, B = 15% - 2%, C = 2% - 0%, D = вид присутній.
2. Збереження (рівень збереження особливостей природних оселищ, які важливі для окремих видів, та можливості їх відновлення): A = відмінне, B = добре, C = посереднє.
3. Ізольованість (ступінь ізольованості популяції в межах Об'єкта у відношенні до природного ареалу виду): A = ізольована популяція, B = на межі ареалу, C = широкопоширений.
4. Глобальність – загальна оцінка цінності Об'єкта для збереження виду: A = відмінне, B = добре, C = посереднє.

Other important species of flora and fauna

Species			Population in the site						Motivation						
Group	Code	Scientific name	S	NP	Size		Unit	Cat.	Species appendix			Other categories			
					Min	Max			I	II	III	A	B	C	D
B	A087	Buteo buteo			5	50	i	C						X	
B	A087	Buteo buteo			1	20	i	C						X	

Види фауни Резолюції № 6 Бернської конвенції та інші важливі види (Tarutynskyi Steppe)

Тварини	Види фауни Резолюції № 6 Бернської конвенції	Інші важливі види
Комахи	3	10
Амфібії та рептилії	2	7
Птахи	37	4
Ссавці	4	5

Птахи:

- огар;
- кібчик;
- лунь лучний;
- канюк степовий;
- орел-карлик;
- сова болотяна;
- сиворакша;
- щеврик польовий;
- жайворонок степовий;
- сорокопуд терновий;
- сорокопуд чорнолобий;
- вівсянка садова

- лелека чорний;
- деркач;
- балабан;
- сапсан;
- лунь польовий;
- лунь степовий;
- шуліка чорний;
- зміїд;
- орлан-білохвіст;
- підорлик малий
- беркут;
- яструб коротконогий;

- лелека білий;
- чапля руда;
- чапля біла;
- чепура мала;
- осоїд;
- підсоколик малий;
- лунь очеретяний;
- дрімлюга;
- дятел сірійський;
- жайворонок лісовий;
- трав'янка рябогруда;
- мухоловка білошия;
- мухоловка мала.


3. Екологічна інформація в стандартній і оновлених формах (птахи):

- Гніздування – 1-2 обліки на сезон:
 - відносний облік для птахів, що гніздяться поодинокими парами;
 - абсолютний облік гнізд для колоніальних видів птахів.
- Міграції та зимівля – 2 навесні, 3 восени, 1 взимку:
 - маршрутні обліки в основних біотопах;
 - точкові обліки в основних біотопах.


Моніторинг ефективності Плану управління (птахи):

- щорічні обліки гніздових (колоніальних) птахів на ділянках, де проводяться заходи з відновлення/покращення умов гніздування .
- регулярні обліки на ділянках, де проводяться заходи з відновлення або покращення умов оселища і на контрольній ділянці.

Моніторинг стану популяцій птахів в «Тарутинському степу»



Автомобільний маршрут обліку птих за програмою POM



Дякую за увагу!